

キイトルーダ+CBDCA+nabPTX	ベムプロリズマブ	200 mg/body	d1	21～28日
	カルボプラチン	AUC 5～6	d1	
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	d1、8、15	
キイトルーダ+CBDCA+PEM ※ベメトレキセド初回7日前ビタミンB12を1mg筋注 以後9週間ごと、葉酸0.5g/日連日内服	ベムプロリズマブ	200 mg/body	d1	21日
	カルボプラチン	AUC 5～6	d1	
	ベメトレキセド	500 mg/m ²	d1	
キイトルーダ+CBDCA+PTX ※ベメトレキセド初回7日前ビタミンB12を1mg筋注 以後9週間ごと、葉酸0.5g/日連日内服	ベムプロリズマブ	200 mg/body	d1	21日
	カルボプラチン	AUC 5～6	d1	
	パクリタキセル	200 mg/m ²	d1	
キイトルーダ+CDDP+PEM ※ベメトレキセド初回7日前ビタミンB12を1mg筋注 以後9週間ごと、葉酸0.5g/日連日内服	ベムプロリズマブ	200 mg/body	d1	21日
	シスプラチン	75 mg/m ²	d1	
	ベメトレキセド	500 mg/m ²	d1	
キイトルーダ+PEM(維持)	ベムプロリズマブ	200 mg/body	d1	21日
※ベメトレキセド初回7日前ビタミンB12を1mg筋注 以後9週間ごと、葉酸0.5g/日連日内服	ベメトレキセド	500 mg/m ²	d1	
サイラムザ (内服併用)	ラムシルマブ	10 mg/kg	d1	14日
テセントリク	アテゾリズマブ	1200 mg/body	d1	21日
テセントリク+Bev (維持)	アテゾリズマブ	1200 mg/body	d1	21日
	ベバシズマブ	15 mg/kg	d1	
テセントリク+CBDCA+nabPTX	アテゾリズマブ	1200 mg/body	d1	21～28日
	カルボプラチン	AUC 5～6	d1	
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	d1、8、15	
テセントリク+CBDCA+PEM	アテゾリズマブ	1200 mg/body	d1	21日
	カルボプラチン	AUC 5～6	d1	
	ベメトレキセド	500 mg/m ²	d1	
テセントリク+CBDCA+PTX+Bev	アテゾリズマブ	1200 mg/body	d1	21日
	カルボプラチン	AUC 5～6	d1	
	パクリタキセル	200 mg/m ²	d1	
	ベバシズマブ	15 mg/kg	d1	
テセントリク+CDDP+PEM	アテゾリズマブ	1200 mg/body	d1	21日
	シスプラチン	75 mg/m ²	d1	
	ベメトレキセド	500 mg/m ²	d1	
テセントリク+PEM	アテゾリズマブ	1200 mg/body	d1	21日
	ベメトレキセド	500 mg/m ²	d1	
ニボルマブ (240mg/body)	ニボルマブ	240 mg/body	d1	14日
ニボルマブ (480mg/body)	ニボルマブ	480 mg/body	d1	28日
CBDCA低用量(放射線併用)	カルボプラチン	30 mg/m ²	d1-20	20日
ニボルマブ+CBDCA+GEM(術前)	ニボルマブ	360 mg/body	d1	21日
	カルボプラチン	AUC 5	d1	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d1、8	