悪性リンパ腫				
レジメン名	薬剤	投与量	投与スケジュール	投与間隔
ABVD	ドキソルピシン	25 mg/m ²	d1、15	28日
	プレオマイシン	10 mg/m ² (最高15 mg/body)	d1、15	
	ビンブラスチン	6 mg/m ² (最高10 mg/body)	d1、15	
	ダカルバジン	375 mg/m ²	d1、15	
AVD + アドセトリス	ドキソルピシン	25 mg/m ²	d1、15	28日
	ビンブラスチン	6 mg/m ² (最高10 mg/body)	d1、15	
	ダカルバジン	375 mg/m ²	d1、15	
	ブレンツキシマブ ベトチン	1.2 mg/kg(最高120 mg/body)	d1、15	
CHOP	シクロホスファミド	750 mg/m ²	d1	21日
70~80歳 2/3dose	ドキソルピシン	50 mg/m ²	d1	
80歳以上 1/2dose	ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最高2 mg/body)	d1	
	プレドニゾロン経口	100 mg/日	d1、2、3、4、5	
GDP	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	d1、8	21日
	シスプラチン	75 mg/m ²	d1	
	デキサメタゾン	40 mg/日	d1、2、3、4	
GEM(1000)療法	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	d1、8、15	28日
MTX-HOPE	メソトレキセート経口	20 mg/body	d1	21日
	ヒドロコルチゾン	100 mg/body	d2	
	ビンクリスチン	1 mg/body	d2	
	エトポシド経口	25 mg/body	d3、4	
	ソブゾキサソ経口	400 mg/body	d3、4	
R-MTX-HOPE	リツキシマブ	375 mg/m ²	d1	21日
	メソトレキセート経口	20 mg/body	d2	
	ヒドロコルチゾン	100 mg/body	d2	
	ビンクリスチン	1 mg/body	d2	
	エトポシド経口	25 mg/body	d3、4	
	ソブゾキサソ経口	400 mg/body	d3、4	
R-B	リツキシマブ	375 mg/m ²	d1	28日
	ベンダムスチン	90 mg/m ²	d1、2	
R-CHOP	リツキシマブ	375 mg/m ²	d1	21日
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	d2	
	ドキソルピシン	50 mg/m ²	d2	
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最高2 mg/body)	d2	
	プレドニゾロン経口	100 mg/日	d2、3、4、5、6	
R-COP	リツキシマブ	375 mg/m ²	d1	21日
CO:70~80歳 2/3dose	シクロホスファミド	750 mg/m ²	d2	
80歳以上 1/2dose	ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最高2 mg/body)	d2	
	プレドニゾロン経口	100 mg/日	d2、3、4、5、6	
R-GDP	リツキシマブ	375 mg/m ²	d1	21日
	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	d2、9	
	シスプラチン	75 mg/m ²	d2	
	デキサメタゾン	40 mg/日	d2-6	
R-THP-COP	リツキシマブ	375 mg/m ²	d1	21日
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	d2	
	ピラルピシン	50 mg/m ²	d2	
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最高2 mg/body)	d2	
	プレドニゾロン経口	100 mg/日	d2、3、4、5、6	
アドセトリス(CD30陽性リンパ腫)	ブレンツキシマブ ベトチン	1.8 mg/kg	d1	21日
ガザイバ(単独)(維持療法) 2か月ごと、最長2年間	オビヌツズマブ	1000 mg/日	d1	56日
リツキシマブ(単独)	リツキシマブ	375 mg/m ²	d1	7日
G-B(初回)	オビヌツズマブ	1000 mg/日	d1、8、15	28日
	ベンダムスチン	90 mg/m ²	d1、2	
G-B(2クール目以降)	オビヌツズマブ	1000 mg/日	d1	28日
	ベンダムスチン	90 mg/m ²	d1、2	