

レジメン名	薬剤	投与量	投与スケジュール	投与間隔
Cmab単独	セツキシマブ	1回目:400 mg/㎡	d1	7日
	セツキシマブ	2回目以降::250 mg/㎡		
FOLFIRI(CPT-11(150))+AFL	アフリベルセプト	4 mg/kg	d1	14日
	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	400 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
	イリノテカン	150 mg/㎡	d1	
	ラムシムマブ	8 mg/kg	d1	
FOLFIRI(CPT-11(150))+RAM	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	14日
	フルオロウラシル	400 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
	イリノテカン	150 mg/㎡	d1	
FOLFIRI(CPT-11(150))+Bev	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	14日
	フルオロウラシル	400mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
	イリノテカン	150 mg/㎡	d1	
FOLFOXIRI	ベバシズマブ	5 mg/kg	d1	14日
	イリノテカン	150 mg/㎡	d1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	
	オキサリプラチン	85 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
FOLFOXIRI+Bev	ベバシズマブ	5 mg/kg	d1	14日
	イリノテカン	150 mg/㎡	d1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	
	オキサリプラチン	85 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
IRIS(3週)	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	d1-14	21日
	イリノテカン	150 mg/㎡	d1	
IRIS(4週)	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	d1-14	28日
	イリノテカン	125 mg/㎡	d1、15	
IRIS(4週)+Bev	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	d1-14	28日
	ベバシズマブ	5 mg/kg	d1、15	
	イリノテカン	100 mg/㎡	d1、15	
IRIS(4週)+Pmab	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	d1-14	28日
	パニツムマブ	6 mg/kg	d1、15	
	イリノテカン	100 mg/㎡	d1、15	
SOX+Bev	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	d1	21日
	オキサリプラチン	130 mg/㎡	d1	
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	d1-14	
	オキサリプラチン	130 mg/㎡	d1	
SOX+Pmab	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	d1-14	21日
	パニツムマブ	6 mg/kg	d1	
SOX	オキサリプラチン	130 mg/㎡	d1	21日
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	d1-14	
TAS-102+BEV	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合錠	70 mg/㎡	d1-5、d8-12	28日
	ベバシズマブ	5 mg/kg	d1、15	
XELIRI+Bev	イリノテカン	200 mg/㎡	d1	21日
	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	d1	
	カベシタピン	1600 mg/㎡	d1-14	
XELIRI	イリノテカン	200 mg/㎡	d1	21日
	カベシタピン	1600 mg/㎡	d1-14	
XELOX	カベシタピン	2000 mg/㎡	d1-14	21日
	オキサリプラチン	130 mg/㎡	d1	
XELOX+Bev	カベシタピン	2000 mg/㎡	d1-14	21日
	オキサリプラチン	130 mg/㎡	d1	
	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	d1	
Pmab	パニツムマブ	6 mg/kg	d1	14日
sLV5FU	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	14日
	フルオロウラシル	400 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
sLV5FU+BEV(5)	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	14日
	フルオロウラシル	400 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
	ベバシズマブ	5 mg/kg	d1	
BEV(5)+mFOLFOX	ベバシズマブ	5 mg/kg	d1	14日
	オキサリプラチン	85 mg/㎡	d1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	400 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
C-mab+FOLFIRI	セツキシマブ	1回目:400 mg/㎡ 2回目以降:250 mg/㎡	d1、8	14日
	イリノテカン	150 mg/㎡	d1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	400 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
C-mab+mFOLFOX6	セツキシマブ	1回目:400 mg/㎡ 2回目以降:250 mg/㎡	d1、8	14日
	オキサリプラチン	85 mg/㎡	d1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	400 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
FOLFIRI(CPT-11(150))	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	14日
	フルオロウラシル	400 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
	イリノテカン	150 mg/㎡	d1	
Pmab(6)+mFOLFOX6	パニツムマブ	6 mg/kg	d1	14日
	オキサリプラチン	85 mg/㎡	d1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	400 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
Pmab(6)+FOLFIRI	パニツムマブ	6 mg/kg	d1	14日
	イリノテカン	150 mg/㎡	d1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	400 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
mFOLFOX6(L-OHP(85))	オキサリプラチン	85 mg/㎡	d1	14日
	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	400 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
IRI+Pmab	イリノテカン	150 mg/㎡	d1	14日
	パニツムマブ	6 mg/kg	d1	
隔週C-mab+FOLFIRI	セツキシマブ	500 mg/㎡	d1	14日
	イリノテカン	150 mg/㎡	d1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	400 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
隔週C-mab+mFOLFOX6	セツキシマブ	500 mg/㎡	d1	14日
	オキサリプラチン	85 mg/㎡	d1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	400 mg/㎡	d1	
	フルオロウラシル	2400 mg/㎡	d1	
PER+HER	ペルツズマブ	1回目:840 mg/body 2回目以降:420 mg/body	d1	21日
	トラスツズマブ	1回目:8 mg/kg 2回目以降:6 mg/kg	d1	
フェスゴIN（初回）	ペルツズマブ	1200 mg/body	d1	21日
	トラスツズマブ	600 mg/body	d1	
フェスゴMA（2回目以降）	ペルツズマブ	600 mg/body	d1	21日
	トラスツズマブ	600 mg/body	d1	